

老年人应该了解的眼底病变风险

老年人如何通过日常症状识别、及时发现潜在的眼底病变风险？

北京同仁医院主任医师魏文斌表示,在老年人群当中,糖尿病性的视网膜病变、视网膜静脉阻塞这些眼底疾病发病率较高。然而,这些疾病的早期症状常常不典型,容易被忽视,导致延误治疗,最终可能造成视力的严重损害,甚至于失明。因此,尽早识别潜在的眼底病变风险至关重要。

涂抹香油或酒精能让蝉虫自行脱落、被蚊子叮咬后涂抹牙膏或肥皂水就能好、戴眼镜早会让近视度数涨得更快、一些产品能够使眼轴回退消除近视……随着季节变化、暑假临近，一些“应季”的谣言也卷土重来。

“涂抹香油或酒精刺激蜱虫会使其加速分泌唾液，增加被蜱虫携带病原体感染的风险。”中国疾控中心研究员刘起勇解释称，蜱虫被刺激后还会收缩身体，甚至导致口器断裂并残留在皮肤内，引起局部炎症、感染等。

随着天气变热、湿热交蒸,自然界蚊虫增多,夏季健康问题呈现出新特点,人们在处理时会存在一些误区。刘起勇说,被蚊子叮咬后涂抹牙膏或肥皂水预防传染病是没有科学证据支持的。牙膏和肥皂水仅能缓解叮咬后的瘙痒症状,无法杀灭其携带的登革热病毒和疟

魏文斌说,老年人如果出现以下的表现,应该提高警惕、及时就医:

一是视力异常,包括视物模糊,特别是突发的或者是渐进性的视力下降,以及视物变形,比如说直线变得弯曲、方格扭曲,均可能是眼底病变的警示信号。

二是视野的改变,眼前出现固定的黑影、闪光感、漂浮物的增多或者是视野边缘出现缺损,比如说部分老年人走路的时候常常撞到

原虫等病原体,因此无法阻止感染。被蚊虫叮咬后,若出现发热等不适症状,需及时就医。

“常有人问：蚊子是不是偏爱某种血型，比如O型血？目前科学研究证实血型与蚊子吸血偏好没有明确的关联。”刘起勇介绍，蚊子选择叮咬对象时，更依赖实际生理特征和环境因素。人体呼出的二氧化碳是蚊虫定位的核心信号，代谢旺盛的人，如孕妇、运动后人群等更容易被蚊虫叮咬。

每年暑假都会迎来“摘镜热”，人们关注的热点领域往往会生出谣言。市面上一些“近视防控贴”“护眼仪”等产品，为了提高销量进行虚假宣传，声称能使眼轴回退消除近视。对此，北京同仁医院主任医师魏文斌介绍，近视一旦产生是不可逆的，一些产品的宣传缺乏高质量证据验证，长期有效性和安全性无法保证，部分产品长期使用还

门框,都需要警惕视网膜疾病。

三是色觉的异常,如视物颜色变淡或者视物变黄。

四是单眼视力差异,交替遮盖单眼来进行对比的时候,如果发现某一侧的视力明显下降,应该尽快就医检查。

魏文斌强调,对于老年眼底疾病,应该遵循“早发现、早诊断、早治疗”的“三早”原则。建议50岁以上健康人群,以及患有糖尿病、高血压

这些“应季”的谣言不要信！

可能造成视网膜不可逆损伤。

“主流的激光近视手术，如全飞秒、半飞秒激光矫正等，技术发展已经比较成熟，安全性高。”魏文斌说，大量临床数据和长期随访结果显示，只要术前严格评估，排除不适合人群，术后视觉质量良好。

针对家长关心的青少年用眼问题,魏文斌解释道,一些家长认为,孩子只需学习时戴眼镜,这种用眼方式多数情况下是不合理的。除非眼科医生有特殊建议,单纯性近视的青少年应该全日戴镜。配戴合适的眼镜不仅是为了“看清楚”,更是保持眼睛的调节力处于放松状态。此外,稳定清晰的视觉输入能确保儿童大脑视觉中枢正常发育。

“目前也没有确凿证据证明摄入某些食物能够显著改善视力或者是延缓近视发展。”魏文斌说，一

等全身慢性疾病和高度近视的患者,即使没有明显的症状,也应该每半年至一年进行一次眼底检查。

“随着眼底检查技术的进步和发展,眼底检查不仅能够早期发现眼底病变,还能够通过观察视网膜血管的变化,提示全身性的疾病风险。”魏文斌举例,视网膜血管的异常可以反映高血压、动脉硬化等等全身性的血管问题,有助于及早发现健康隐患并采取干预的措施。(据人民网报道)

些对眼睛有益的营养素,其作用主要是维持眼部组织正常功能,过度补充此类物质并不能直接预防或者是逆转白内障、黄斑变性等眼病。一般情况下,没有明显营养缺乏或没有明显眼病病史人群,不建议额外补充维生素类营养素或眼保健产品。儿童盲目服用高剂量维生素A,可能引起肝毒性等副作用。

“与健康相关的谣言花样繁多,掌握识别谣言的技巧很重要。”国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长胡强强说,有些谣言会使用大量煽动性、极端化语言渲染情绪,例如用“紧急”“速转”“救命”“震惊”“为了家人转发”等话术诱导点击转发,具有这些特征的健康信息大多是谣言,遇到无法辨别真伪的健康信息,可到官方网站的“辟谣平台”检索查询。

(据《科技日报》)

[illegible]